



TRYTOR

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA sob o nº 23721

COMPOSIÇÃO:

butoxethyl 3,5,6-trichloro-2-pyridoxacetate
(TRICLOPIR-BUTOTÚLICO) 667 g/L (66,7 m/v)
Equivalente ácido de Triclopir 480 g/L (48,0 m/v)
Outros ingredientes 465,3 g/L (46,53 m/v)

GRUPO	O	HERBICIDA
-------	---	-----------

CONTEÚDO: VIDE RÓTULO

CLASSE: Herbicida seletivo, de ação sistêmica

GRUPO QUÍMICO: Ácido piridinoloxalcano

TIPO DE FORMULAÇÃO: Concentrado Emulsionável (EC)

TITULAR DO REGISTRO (*)

BRA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA.

Rua São José, 550 - Piracicaba/SP - CEP: 13400-330

Fone: (19) 3402-1975 - CNPJ: 07.057.944/0001-44

Número de registro do estabelecimento no Estado: 879 - CDA/CFICS/SP

(*) IMPORTADOR (PRODUTO FORMULADO)

FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO:

TRICLOPIR TÉCNICO BRA (Registro MAPA nº 30119)

LIER CHEMICAL CO., LTD.

Economic and Technical Development Zone, Mianyang, Sichuan - China

TRICLOPIR-BUTOTÚLICO TÉCNICO RAINBOW (Registro MAPA nº TC12320)

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

Binhai Economic Development Area 262737 Weifang, Shandong - China

FORMULADORES:

AIMCO PESTICIDES LIMITED: B1/1, M.I.D.C, Industrial Area, P.O. Box N° 9,

Village - Awashi, Dist. Ratnagiri, Maharashtra - India

CHIZHOU BIOAGRICLAND MULTICHEM CO., LTD.: Xiangyu Chemical Industry Park, Dongzhi County, Chizhou City, Anhui Province - China

FEROLS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: Rodovia Castelo Branco,

km 68,5 - Olhos d'água - CEP: 18120-070 - Marília/SP

CNPJ: 47.226493/0001-46 - Registro no Órgão estadual: 31 CDA/CFICS/SP

HUNAN BIDE BIOCHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Ruxi Chemical Industry Zone Linxiang, Yueyang, Hunan - China

INDÚSTRIAS QUÍMICAS LORENA LTDA: Rua 01, esquina/c/ Rua 6, s/nº

Lojamento Industrial Nova Roséira - CEP: 12580-000 - Roséira/SP

CNPJ: 48.284.749/0001-34 - Registro no Órgão estadual: 266 CDA/CFICS/SP



LIER CHEMICAL CO., LTD.

Economic and Technical Development Zone, Mianyang, Sichuan - China

LIER CROSCIENCE CO., LTD.

Nº 329 South Mianzhou Avenue, Mianyang, Sichuan - P.R. China

NANJING GOODAGRO CO., LTD.: Nº 1 Fangshui Road East, Nanjing Chemical Industry Park, Nanjing, Jiangsu - China

PRENTISS QUÍMICA LTDA: Rodovia PR 423, km 24,5 - CEP: 83603-000 - Campo Largo/PR

CNPJ: I-00.729.422/0001-00 - Registro no Órgão estadual: 2669 ADAPAR/PR

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737 - China

SULPHUR MILLS LTD: 1904, A-18/18, G.I.D.C. - Panoli - Bharuch - Gujarat - India

SULPHUR MILLS LTD: 1905/1928/29/30, G.I.D.C. - Panoli - Bharuch - Gujarat - India

SULPHUR MILLS LTD: Plot nº 230/231/232, G.I.D.C. - Panoli - Bharuch - Gujarat - India

KUBIX AGROINDUSTRIAL LTDA.

Rua Bonfáço Rosso Ros, 260, Cruz Alta - CEP: 13.348-790 - Indaiatuba/SP

CNPJ: 47.754.052/0001-17 - Registro no Estado nº 1248 - CDA/CFICS/SP

CAC NANTONG CHEMICAL CO., LTD.: Fourth Huanghai Road, Yangkou Chemical Industrial Park, Rudong County, Nantong City, Jiangsu Province - P.R. China

JIANGXI HUIHE CHEMICAL CO., LTD.: Spark Industrial park, Yunshan Economic Development Zone, Yongxiu County, Jiangxi - China

JIANGXI TIANYU CHEMICAL CO., LTD.: Yanhua Road, Xing'an Salt Chemical Industrial Park, Xing'an County, Jiangxi Province, P.R. China

YONGNONG BIOSCIENCES CO., LTD.: N° 3, WeiQi Rd (East) Hangzhou Gulf Economy and Technology Development Zone, 312369, Shangyu, Zhejiang China.

FORMULADOR/MANIPULADOR:

NORTOX S.A.: Rodovia BR 369, km 197 - Arapongas/PR

CNPJ: 75.263.400/0001-99 - Registro no órgão estadual: 466 ADAPAR/PR.

OURO FINO QUÍMICA S.A.: Avenida Filomena Cartafina, 22.335 - Quadra 14

Lote 5 - Uberaba/MG - CNPJ: 09.100.671/0001-07

(*) IMPORTADOR (PRODUTO FORMULADO)

FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO:

TRICLOPIR TÉCNICO BRA (Registro MAPA nº 30119)

LIER CHEMICAL CO., LTD.

Economic and Technical Development Zone, Mianyang, Sichuan - China

TRICLOPIR-BUTOTÚLICO TÉCNICO RAINBOW (Registro MAPA nº TC12320)

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

Binhai Economic Development Area 262737 Weifang, Shandong - China

FORMULADORES:

AIMCO PESTICIDES LIMITED: B1/1, M.I.D.C, Industrial Area, P.O. Box N° 9,

Village - Awashi, Dist. Ratnagiri, Maharashtra - India

CHIZHOU BIOAGRICLAND MULTICHEM CO., LTD.: Xiangyu Chemical Industry Park, Dongzhi County, Chizhou City, Anhui Province - China

FEROLS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: Rodovia Castelo Branco,

km 68,5 - Olhos d'água - CEP: 18120-070 - Marília/SP

CNPJ: 47.226493/0001-46 - Registro no Órgão estadual: 31 CDA/CFICS/SP

HUNAN BIDE BIOCHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Ruxi Chemical Industry Zone Linxiang, Yueyang, Hunan - China

INDÚSTRIAS QUÍMICAS LORENA LTDA: Rua 01, esquina/c/ Rua 6, s/nº

Lojamento Industrial Nova Roséira - CEP: 12580-000 - Roséira/SP

CNPJ: 48.284.749/0001-34 - Registro no Órgão estadual: 266 CDA/CFICS/SP

Nº do lote ou da partida:

Data de fabricação:

Data de vencimento:

VIDE EMBALAGEM

ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO, A BULA E A RECEITA AGRONÔMICA E CONSERVE-OS EM SEU PODER.

É OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PROTEJA-SE.

É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA.

INDúSTRIA Brasileira

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA: CATEGORIA 4 - PRODUTO POUCO TÓXICO

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO POTENCIAL DE PERIGOSIDADE AMBIENTAL:

PRODUTO MUITO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE - CLASSE II

APLICAÇÃO AÉREA:

AERONAVES AGRÍCOLAS E AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS ARP

APLICAÇÃO AÉREA:

INTERVALO DE SEGURANÇA:

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE TRÍPLICE LAVAGEM DA EMBALAGEM OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE:

Pastagens.....

Arroz Irrigado.....

Milho.....

Densidade de gotas: 30 gotas/cm².

INSTRUÇÕES DE USO

TRYTOR é um herbicida seletivo de ação sistêmica e pós-emergente para o controle de plantas infestantes em pastagens e em arroz irrigado, nos sistemas de semeadura em solo seco e em solo inundado. É indicado para aplicação em pré-semeadura em milho, soja e trigo. Para aplicação em manejo (dessecação) na pré-semeadura destas culturas (soja e milho), para controle da Buva (*Conyza bonariensis*) e da soqueira de algodão (*Gossypium hirsutum*). Para trigo, TRYTOR também é indicado para aplicação em manejo (dessecação) na pré-semeadura desta cultura (trigo) e para controle da Buva (*Conyza bonariensis*). Consulte sempre um Engenheiro Agrônomo ou profissional responsável.

CULTURAS, PLANTAS INFESTANTES, DOSES, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO:

Cultura	Plantas infestantes	Dose do produto comercial	Volume de calda	Época, número e intervalo de aplicação
Arroz Irrigado	Angiquinho; maracazinho; paquinha; pinheirinho (<i>Aeschynomene rufa</i>)	0,375 a 0,5 L/ha	Aplicação terrestre: 200 - 400 L/ha Aplicação aérea: 30 - 50 L/ha	Pode ser aplicado no período de pós-emergência das plantas infestantes e da cultura até antes do início da fase de emborramento da cultura. Número máximo de aplicação: 1
	Junquinho (<i>Cyperus iria</i>)	0,6 a 0,7 L/ha		Aplicar quando as plantas daninhas estiverem em estádio de 1 a 3 folhas.
	Tiriricão (<i>Cyperus Esculentus</i>)	0,7 a 0,8 L/ha		Aplicar quando a temperatura do ar estiver entre 20°C e 30°C, com menor potencial de chuva.
	Espinheiro; aromita; espoinha; vinhálico-de-espinho (<i>Acacia Farnesiana</i>)	1,5 - 2,0 L/ha		Aplicação terrestre: 200 - 400 L/ha Aplicação aérea: 30 - 50 L/ha
	Cambará; cambara-branco; chumbinho (<i>Lantana camara</i>)			Aplicar TRYTOR na época em que as plantas esejam em intenso processo vegetativo.
	Jurubeba; jurubeba-verdeadeira; gerobeba; jupeba (<i>Solanum paniculatum</i>)			Aplicar TRYTOR na altura do voo menor que 10 km/h não aplique o produto.
	Erva-quente; poala-do-campo; erva-de-lagarto; perpétua-do-mato (<i>Spermacoce alata</i>)			Aplicar TRYTOR na altura do voo menor que 10 km/h não aplique o produto.
	Assa-peixe; assa-peixe-branco; cambara-branco; cambará-açu (<i>Veronica polystachys</i>)	1,5 - 2,0 L/ha		Aplicar TRYTOR na época em que as plantas daninhas estiverem em estádio menor que 3 folhas.
	Pindoba; babacu; coco-pindoba; palha-branca (<i>Orbignya phalerata</i>) ¹¹⁾	5% de produto comercial diluído em óleo diesel*		Aplicar TRYTOR na altura do voo menor que 10 km/h não aplique o produto.
	Erva-quente (<i>Spermacoce Latifolia</i>)	1,5 - 2,0 L/ha		Aplicar TRYTOR na altura do voo menor que 10 km/h não aplique o produto.
Milho	Algodão (<i>Gossypium hirsutum</i>)	1,25 a 2,0 L/ha	Aplicação terrestre: 100 - 200 L/ha Adicionar 0,5% v/v de Alquil éster etoxilado do ácido fosfônico ou óleo mineral emulsionável	Aplicar TRYTOR no estádio de rebrota da soqueira de algodão.
	Buva (<i>Conyza bonariensis</i>)	1,5 a 2,0 L/ha		Realizar um programa de manejo na pré-semeadura, com 2 aplicações sequenciais, sendo a 1ª aplicação por ocasião da presença da soqueira de algodão, e a 2ª com intervalo de 20 a 30 dias após a primeira. A semeadura do Milho deve ser feita respeitando o intervalo mínimo de 10 dias após a segunda pulverização.
	Algodão (<i>Gossypium hirsutum</i>)	1,25 a 2,0 L/ha		Número máximo de aplicação: 2
Soja	Buva (<i>Conyza bonariensis</i>)	1,5 a 2,0 L/ha	Aplicação terrestre: 100 - 200 L/ha Adicionar 0,5% v/v de Alquil éster etoxilado do ácido fosfônico ou óleo mineral emulsionável	Fazer aplicação única de TRYTOR na pós-emergência da Buva em estádio menor que 15cm de altura. Após aplicação, aguardar no mínimo 10 dias para realizar a semeadura do Milho.
	Buva (<i>Conyza bonariensis</i>)	1,5 a 2,0 L/ha		Toda a pulverização com o produto TRYTOR feita fora das condições operacionais e meteorológicas adequadas, pode gerar deriva de gotas e atingir cultivos vizinhos e/ou culturas sensíveis.
Trigo	Buva (<i>Conyza bonariensis</i>)	1,5 a 2,0 L/ha	Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Adicionar 0,5% v/v de Alquil éster etoxilado do ácido fosfônico ou óleo mineral emulsionável	Fazer aplicação única de TRYTOR na pós-emergência da Buva em estádio menor que 15cm de altura. Após aplicação, aguardar no mínimo 10 dias para realizar a semeadura do Trigo.
	Buva (<i>Conyza bonariensis</i>)	1,5 a 2,0 L/ha		Havendo a necessidade de uso de algum adjuvante, checar sempre a compatibilidade da calda, confeccionando-a nas mesmas proporções, em recipientes menores e transparentes, com a finalidade de observar se há homogeneidade da calda, sem haver formação de fases.

Pontas de pulverização: utilize pontas de pulverização que proporcionem gotas grossas a extremamente grossas, ou seja, gotas com diâmetro mediano volumétrico acima de 300 micra com 20 a 40 gotas/cm², com equipamentos adequados para a redução da possibilidade de deriva. Use pontas jato plano (jato simples), com ângulo de abertura no leque menor ou igual a 40 graus e sempre com o bico voltado para trás (zero grau de deflexão).

O profissional responsável que prescrever o uso do TRYTOR deverá recomendar a especificação do equipamento mais adequado para correta aplicação do produto, de modo a reduzir a possibilidade de deriva.

Observe atentamente as instruções de uso de todos os equipamentos envolvidos. Em caso de equipamentos diferentes e regulagens específicas, consulte sempre um Engenheiro Agrônomo ou profissional responsável.

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:

Para evitar os prejuízos causados pela deriva, é importante seguir rigorosamente as recomendações quanto as condições climáticas e equipamento de aplicação.

O produto somente deve ser aplicado sob as seguintes condições operacionais:

- Aplicar durante período de tempo com menor potencial de chuva.
- Temperatura ambiente inferior a 30°C.
- Umidade relativa do ar superior

